

عملية تنظير للبطن والحوض لتشخيص الحمل الهاجر وعلاجه

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: تشخيص الحمل الهاجر وعلاجه واستئصاله.

- قد يتم استئصال إحدى قنوات فالوب حسب الوضع الطبي.
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وستقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة. قد يحدث نزف رحمي يستمر لأسبوعين على الأكثر مماثل لدورة شهرية.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد لا نستطيع الدخول بجهاز المنظار لتجويف البطن والحوض وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة ونضطر إلى عملية فتح بطن.
- قد يحدث جرح في المثانة أو الأمعاء أو الأوعية الدموية.
- قد يحدث جرح أو اختراق في جدار المثانة.
- قد تزيد نسبة العقم وهي نادرة.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى إجراء عملية فتح بطن استكشافية لتشخيص أي مضاعفات قد تحدث وقد نحتاج إلى أخذ استشارات من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث إتهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه إنتان (تسمم الدم).
- قد تحدث آلام في البطن والكتفين.
- قد تظهر كدمات موضعية.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية وحسب ما يراه الأطباء مناسباً وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد ينتج عن استئصال قناة فالوب تقليل في نسبة الخصوبة.
- قد يحدث إتهاب بالحوض أو قد يحدث خراج بالحوض أو تتكون التصاقات قد يسبب الام مزمنة.
- قد تتكون التصاقات خارج الرحم قد تسبب العقم.
- قد يحدث انسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود التصاقات يتطلب إجراء عملية أخرى.



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يحدث فتق في موضع دخول المنظار.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

نوع التخدير:

التخدير الكامل أو النصفى
التخدير الموضعي
التنويم الجزئي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد..... التوقيع..... التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها,

اسم المريضة..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ