

عملية: الولادة القيصرية

الهدف:

ولادة الجنين من خلال إجراء شق في البطن والرحم في حال كان ذلك أكثر أمناً من الولادة الطبيعية للأم أو الطفل أو كليهما معاً سواء كانت العملية مبرمجة أو طارئة.

النتيجة:

- قد يكون هناك حاجة إلى عمليات قيصرية في الأحمال القادمة إذا كانت هذه العملية القيصرية الأولى.
- قد يكون هناك حاجة دائمة إلى الولادة عن طريق العمليات القيصرية في حال كانت هذه هي العملية القيصرية الثانية أو أكثر.
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وستقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن إستكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.
- قد تتأخر العملية عن موعدها المقرر لأي سبب طبي أو غير طبي دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.
- قد تكون هناك احتمالية إدخال الطفل المولود إلى الخداج لظروف طبية مختلفة بغض النظر عن عمر الحمل يقرها طبيب الخداج المتواجد أثناء العملية.
- سيقوم بإجراء العملية الإختصاصي أو من لديه الصلاحيات الطبية المعمول بها في المستشفى.

المضاعفات:

أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

المضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث جرح في المثانة أو الحالب أو ربطه.
- قد يحدث جرح في الأمعاء وأن حصل قد يكون هناك حاجة باحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد نحتاج إلى إصلاح أعضاء داخلية في حال تضررها (المثانة، الحالب، الأمعاء).
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم، وقد تحدث مضاعفات نقل الدم.
- قد نحتاج إلى استئصال الرحم بشكل طارئ بسبب النزيف وهو غير شائع.
- قد يحدث جروح طفيفة لدى الجنين وهو شديد الندرة.
- قد يحدث كسر في أحد عظام الجنين أثناء الولادة وهو شديد الندرة.
- قد يحدث تمزق في عنق الرحم أو الرحم مما يستدعي رتقه.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين وقد تحدث جلطات أمينوسية في مناطق مختلفة من الجسم.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد نحتاج إلى أخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل الجراحي آخر.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث كدمات حول الجرح.
- قد يحدث إلتهاب المسالك البولية وتهيج المثانة.
- قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة.
- قد يحدث إلتهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه إنتان (تسمم الدم).
- قد يحدث تأخر في إلتئام الجرح.
- قد يحدث ندبة مكان الجرح.
- قد يحدث خدران وتتميل في مكان الجرح.
- قد يحدث إلتهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض.
- قد يحدث نزيف داخلي متأخر.
- قد نحتاج إلى نقل دم أو مكونات دم. قد نحتاج إلى اخذ إستشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد يحدث إصلاح أعضاء داخلية حال تضررها (مثانة، حالب، أمعاء).
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يحصل ناسور (ما بين المثانة والمهبل أو الأمعاء والمهبل الذي قد يستدعي عملية جراحية أخرى لإصلاح ذلك).
- قد تحدث جلطات دموية في الأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد يحدث فتق مكان جرح العملية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك الحاجة إلى إستئصال الرحم بشكل طارئ.
- قد يحدث نزف في عنق الرحم أو الرحم في الأحمال اللاحقة أثناء الحمل والولادة وهو غير شائع.
- قد يحدث إلتصاقات داخل البطن والحوض الذي قد تسبب آلام مزمنة أو صعوبة بلحمل.
- قد يحدث كسل أو إنسداد أمعاء نتيجة حصول او وجود التصاقات يتطلب إجراءات تحفظية أو إجراء عملية أخرى.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث إرتخاء في جدار المهبل (تهببطة نسائية) في حال تم استئصال الرحم لظروف طبية خاصة وهو نادر.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيت الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع أسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها،

اسم المريضة التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ