

اسم العملية: استئصال الألياف عن طريق المنظار

الغرض/الفائدة: تضمن العملية إزالة ليف أو ألياف من الرحم لأسباب طبية مختلفة عن طريق المنظار.

- هناك احتمالية للولادة بواسطة العمليات القيصرية في الأحمال القادمة.

- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وسنقوم بإعطاء المريضة الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة اضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية
- قد نحتاج في الحالات الصعبة لضرورة طبية طارئة لاستئصال الرحم وهو شديد الندرة.

النتيجة: إزالة الليف أول الألياف من الرحم.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- فشل الدخول بجهاز المنظار لتجويف البطن والحوض وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة.
- قد تحدث زيادة في نسبة العقم في حال كانت المريضة في عمر الإنجاب
- قد يحدث جرح في المثانة أو الأمعاء أو الأوعية الدموية وهو نادر أن يحدث.
- قد يحدث جرح في الحالب أو ربط الحالب.
- قد يحدث جرح في الأمعاء وأن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد نحتاج إلى إصلاح أعضاء داخلية في حالة تضررها (المثانة، الحالب، الأمعاء).
- قد نحتاج إلى استئصال الرحم لضرورة طبية طارئة وهو شديد الندرة.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية لإصلاح الأعضاء المتضررة حال وجودها وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن وحسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث كدمات حول الجرح.
- قد يحدث إتهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة.
- قد يحدث التهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنها (تسمم الدم).
- قد يحدث التهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض
- قد نحتاج إلى نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى أخذ إستشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد نحتاج إلى إصلاح أعضاء داخلية حال تضررها (مثانة، حالب، أمعاء).
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يحدث ناسور (ما بين المثانة والمهبل أو الأمعاء والمهبل الذي قد يستدعي عملية جراحية أخرى لإصلاح ذلك).
- قد تحدث التصاقات داخل البطن والحوض والرحم الذي قد تسبب آلام مزمنة أو صعوبة بالحمل.
- قد يحدث إنسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود التصاقات يتطلب إجراء عملية أخرى.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك الحاجة إلى استئصال الرحم بشكل طارئ.
- قد يحدث احتمال وجود المشيمة الهابطة أو الملتصقة في الأحمال اللاحقة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- ارتفاع نسبة انفجار الرحم في الأحمال اللاحقة.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب /ة: التوقيع: التاريخ:

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ:

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع أسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة: التوقيع: التاريخ:

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ: