

عملية: استئصال الرحم عن طريق المنظار

اسم الإجراء: عملية استئصال الرحم باستخدام المنظار الرحمي (وقد يتم استئصال أحد المبيضين أو كلاهما، وأخذ عينات من أنسجة في البطن أو استئصال بعض الغدد اللمفاوية أو الندب إذا دعت الحاجة الطبية).

- قد يكون هنالك الحاجة لإجراء توسيع لعنق الرحم سواء باستخدام الأدوات الطبية الموسعة أو من خلال تحاميل مهبلية طبية (أدوية) يتم استخدامها قبل العملية لتوسيع عنق الرحم.
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وستقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يحدث نزف رحمي يستمر لأسبوعين على الأكثر مماثل لدورة شهرية.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

النتيجة: عدم القدرة على الحمل وعدم حصول دورة شهرية.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- فشل الدخول بجهاز المنظار لتجويف البطن والحوض وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة.
- قد يحدث جرح في المثانة أو الأمعاء أو الأوعية الدموية وهو نادر أن يحدث.
- قد يحدث جرح في المثانة أو الحالب أو ربطه.
- قد يحدث جرح في الأمعاء وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للامعاء خارج البطن.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية لإصلاح الأعضاء المتضررة حال وجودها وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للامعاء خارج البطن وحسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنينين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث التهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه (تسمم الدم).
- قد يحدث نزف داخلي قد يحتاج إلى دخول مستشفى أو مراقبة أو تدخلات جراحية أخرى.
- قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة.
- قد يحدث الأم في البطن والكتفين.



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يحدث كدمات حول الجرح.
- قد يحدث التهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية وان حصل قد يكون هناك حاجة باحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن، وحسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث التهاب بالحوض أو قد يحدث خراج بالحوض أو التصاقات قد يُسبب الآلام المُزمنة.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

نوع التخدير:

التخدير الكامل أو النصفي
التخدير الموضعي
التنويم الجزئي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيتُه الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ