



جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

عملية: تجريف رحمى تشخيصي

(مع أو بدون استئصال زوائد لحمية أو عينات من عنق الرحم)

اسم الإجراء: إجراء جراحي لأسباب طبية مختلفة وقد يتم أخذ عينات من بطانة الرحم أو عنق الرحم أو استئصال زوائد لحمية من عنق الرحم إن وجدت.

- قد يكون هنالك الحاجة لإجراء توسيع لعنق الرحم سواء باستخدام الأدوات الطبية الموسعة أو من خلال تحاميل مهبلية طبية (أدوية) يتم استخدامها قبل العملية لتوسيع عنق الرحم
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وسنقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة
- قد يحدث نزيف رحمى يستمر لأسبوعين على الأكثر مماثل لدورة شهرية
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو اختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية
- قد تتأخر العملية عن موعدها المقرر لأي سبب طبي أو غير طبي دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية
- سيقوم بإجراء العملية الاختصاصي أو من لديه الصلاحيات الطبية المعمول بها في المستشفى

المضاعفات: إن أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

المضاعفات أثناء العملية:

- قد لا نستطيع الدخول بجهاز للتجويف الرحمي وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة
- قد يحدث نزف رحمى قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم
- قد يحصل اختراق في جدار الرحم وقد نحتاج لمراقبة المريضة داخل المستشفى أو إجراء عملية جراحية (تنظير أو فتح بطن) لرتق هذا الاختراق (الثقب) وكل حالة تختلف عن الحالة الأخرى
- قد نحتاج إلى إجراء عملية تنظير استكشافية للبطن والحوض لتشخيص أي مضاعفات قد تحدث وقد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل الجراحي آخر.
- قد يحصل جرح في عنق الرحم وقد نحتاج إلى رتقه
- قد يحدث تمزق في عنق الرحم أو الرحم مما يستدعي رتقه
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

المضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث نزف رحمى قد يحتاج إلى دخول مستشفى أو مراقبة أو تداخلات جراحية أخرى
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً
- قد يحدث التهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض أو تكون التصاقات قد يسبب الآلام المزمنة
- قد تحدث التصاقات داخل الرحم قد تسبب عقم إذا كانت المريضة في سن الإنجاب



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يحدث إرتخاء في عنق الرحم في الأحمال اللاحقة الذي قد يسبب إجهاضات في بداية النصف الأول من الثلث الثاني من الحمل أو ولادات مبكرة مما قد يستدعي وضع غرزة على العنق الرحم اذا كانت المريضة في سن الانجاب
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

نوع التخدير:

التخدير الكامل

التخدير النصفي

التخدير الموضعي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيت أنه الأنسب لقدرة المريضة على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب /ة التوقيع التاريخ

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ:

أنا المريضة قد تم شرح كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف أنه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانات تامة لأي إجراء وإنما أستطيع الامتناع عن العملية في أي وقت لحين البدء بها

اسم المريضة: التوقيع التاريخ:

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ: