

نموذج إقرار طبي

عملية: رفع مجرى البول للسلس البولي

اسم الإجراء: إجراء عملية رفع المجرى البولي

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: تحسين أعراض السلس البولي

- سنقوم بإعطاء المسكنات اللازمة.
- سيتواجد طبيب التخدير مع فريق نسائية والتوليد.
- سنحتاج إلى وضع قسطرة بولية.
- قد نحتاج إلى وضع شاش معقم داخل المهبل
- قد ينصح الأطباء بعدم الجماع لمدة ستة أسابيع.
- قد تحتاج السيدة إلى الجلوس بطريقة معينة لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.
- ممنوع قيادة المركبات لمدة أسبوعين بعد العملية.
- قد تحتاج السيدة إلى عدم استعمال وضع السجود أو القرفصاء لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.

المضاعفات: إن أي إجراء أو عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث الأم في موضع العملية
- قد يحدث نزف مهلي قد يستدعي نقل دم او مكونات دم وهو نادر جداً
- قد يحصل ثقب أو جرح في جدار المثانة وقد نحتاج لرتق هذا الثقب وتختلف كل حالة عن حالة أخرى
- قد تحدث التهابات المسالك البولية
- قد يحدث احتباس البول والذي قد يحتاج للعلاج أو تدخلات جراحية أخرى لحل هذه المشكلة
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين قد تحتاج المريضة إلى الدخول إلى وحدة العناية المركزة
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث نزيف مهلي قد يحتاج إلى دخول مستشفى أو مراقبة او تدخلات جراحية أخرى
- قد يحدث إرتخاء مكان العملية ويكون هناك ضرورة لإعادة إجراء هذه العملية في ظروف نادرة جداً
- قد يحدث التهاب بالجرح ويحتاج إلى مضادات حيوية وفي بعض الحالات دخول المستشفى
- قد يحدث حدوث خلل وظيفي بالمثانة (موقت أو دائم) وهذا الخلل قد يكون بحاجة إلى تدخل طبي أو جراحي
- قد نحتاج إلى وضع قسطرة بولية بشكل متكرر (بصورة مؤقتة وفي حالات نادرة بصورة دائمة)
- قد يحدث التهاب في الشريط (الشبكة) والنسيج المحيط به يحتاج إلى تدخل الجراحي أو مضادات حيوية في حال تم استعمالها
- قد يحدث تضيق زائد على مجرى البول مما يتطلب إجراء عملية جديدة أو أخرى لتخفيف ضغط الشريط على مجرى البول



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يحدث ناسور ما بين المهبل والمثانة ويحتاج إلى تدخلات جراحية لاحقة وهو نادر جداً
- قد يحدث خدران في احد الفخذين أو كلاهما
- قد يحدث التهاب في المجاري البولية وقت يحتاج إلى مضادات حيوية
- قد يحدث ألم أو صعوبة أثناء الجماع والذي قد يحتاج إلى وقت حتى يتحسن وفي بعض الحالات بحاجة لتدخل جراحي آخر لحل المشكلة
- قد نحتاج إلى إجراء شق كبير بالعجان في حال كانت هناك ولادة مهبلية بعد العملية
- قد يكون هناك ضرورة بأن تكون الولادة القادمة قيصرية حتى لا تتهتك ندبة العملية مع الولادة
- في بعض الحالات بعد الولادة الطبيعية قد تعود أعراض سلس البول
- قد يكون هناك حاجة للدخول للمستشفى مرة أخرى لظروف نادرة جداً
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنيتين
- قد يكون هناك حاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

نوع التخدير:

التخدير الكامل

التخدير النصفي

التخدير الموضعي

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي

للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرة المريضة على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب /ة التوقيع التاريخ