

عملية استئصال الرحم عن طريق البطن

الهدف: استئصال الرحم من خلال فتح البطن عن طريق جرح عرضي أو طولي في أسفل البطن (وقد يتم إستئصال أحد المبيضين أو كلاهما، وأخذ عينات من أنسجة في البطن أو إستئصال بعض الغدد للمفاوية أو الندب إذا دعت الحاجة الطبية).

- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وسنقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

النتيجة: عدم القدرة على الحمل وعدم حصول دورة شهرية.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث جرح في المثانة أو الحالب أو ربطه.
- قد يحدث جرح في الأمعاء وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للامعاء خارج البطن.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام طبية أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث كدمات حول الجرح.
- قد يحدث التهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
- قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة.
- قد يحدث التهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه تسمم الدم.
- تأخر في إلتئام الجرح.
- قد يحدث ندبة مكان الجرح.
- قد يحدث التهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض
- قد يحدث نزيف داخلي متأخر.
- قد نحتاج إلى نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد نحتاج إلى إصلاح أعضاء داخلية حال تضررها (مثانة، حالب، أمعاء).
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يحدث ناصور (ما بين المثانة والمهبل أو الأمعاء والمهبل الذي قد يستدعي عملية جراحية أخرى لإصلاح ذلك).
- قد تتكون إلتصاقات داخل البطن والحوض الذي قد تسبب الأم مزمنة.

- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين.
- قد يحدث فتق مكان جرح العملية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يحدث انسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود التصاقات يتطلب إجراء عملية أخرى.
- قد يحدث إرتخاء في جدار المهبل (تهبطة نسائية).
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيت أنه الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف أنه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانات تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ