



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

عملية استئصال الرحم عن طريق المهبل

الهدف: استئصال الرحم عن طريق المهبل بعد فتح الجدار الأمامي والخلفي للمهبل حول عنق الرحم واستئصال الرحم ثم إعادة تقطيب جدار المهبل.

- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث جرح في المثانة أو الحالب أو ربط الحالب.
- قد يحدث جرح في الأمعاء وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد يكون هناك حاجة إلى إصلاح أعضاء داخلية في حال تضررها (المثانة، الحالب، الأمعاء).
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام طبية أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنينين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يضطر الاختصاصي لإجراء عملية فتح البطن لصعوبة استئصال الرحم عن طريق المهبل لسبب ما أو لحدوث إحدى المضاعفات المذكورة مسبقاً.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث التهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
- قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة.
- قد يحدث التهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه تسمم الدم.
- تأخر في إلتئام الجرح.
- قد يحدث التهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض
- قد يحدث نزيف داخلي متأخر.
- قد نحتاج إلى نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد نحتاج إلى إصلاح أعضاء داخلية في حال تضررها (المثانة، الحالب، الأمعاء).
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يحدث ناسور (ما بين المثانة والمهبل أو الأمعاء والمهبل الذي قد يستدعي عملية جراحية أخرى لإصلاح ذلك).
- قد تتكون التصاقات داخل البطن والحوض الذي قد تسبب الأم مزمنة.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنينين.



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يحدث فتق مكان جرح العملية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يحدث انسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود إلتصاقات يتطلب اجراء عملية أخرى.
- قد يحدث إرتخاء في جدار المهبل العلوي (تهبيطة نسائية).
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيت أنه الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف أنه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء وإنما استطيع الامتناع عن العملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة: التوقيع التاريخ:

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ: