



جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

عملية: ولادة باستخدام الملقط أو الشفاط

اسم الإجراء: إجراء عملية ولادة باستخدام الملقط أو الشفاط

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: الإسراع في عملية الولادة المهبلية في حال عسر الولادة الطبيعية أو وجود حالة مرضية لدى الأم أو وجود خطر على حياة الجنين لتغيرات في نبضه قد تؤثر على سلامته مما يتطلب الإسراع في الولادة المهبلية.

- سنقوم بإعطاء المسكنات اللازمة.
- سيتواجد طبيب الأطفال مع فريق النسائية والتوليد وقد يتواجد طبيب التخدير أيضاً.
- قد نحتاج إلى وضع قسطرة بولية.
- قد نحتاج لإجراء شق العجان لتسهيل الولادة.

المضاعفات: إن أي إجراء أو عملية تحمل خطورة معينة و مضاعفات أثناءه وبعده.

مضاعفات أثناء الإجراء:

1. قد يحدث نزف أثناء الولادة قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم ومضاعفات ذلك.
2. قد تحدث جروح مختلفة في منطقة العجان بدرجات مختلفة ومنها الدرجة الثالثة والرابعة وسنقوم برتقها باستخدام الأدوات الطبية المناسبة وما يتبع ذلك من مضاعفات.
3. قد يكون هناك صعوبة في ولادة كتف الجنين (تعسر الولادة) وبالتالي سنقوم بإجراءات طبية مناسبة طارئة قد ينتج عنها كسر في عظمة الترقوة أو إصابة عصب في منطقة إبط الجنين تؤدي إلى تعطل جزئي مؤقت أو دائم في أحد الطرفين العلويين ونادراً ما يصاحب ذلك من نقص التروية والأكسجين للدماغ.
4. قد نضطر لإجراء عملية قيصرية طبية مستعجلة في حال كان هناك فشل لاستخدام الملقط أو الشفاط.
5. قد تحدث حساسية لبعض أنواع الأدوية.
6. قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

1. قد يحدث نزف رحمي ما بعد الولادة.
2. قد نحتاج إلى نقل دم أو مكونات دم ومضاعفاته.
3. قد يحدث كدمات حول جرح منطقة العجان.
4. قد نحتاج وضع قسطرة بولية.
5. قد نحتاج لوضع شاش طبي داخل المهبل وسيتم إزالته لاحقاً.
6. قد يحدث إلتهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
7. قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة والشرج.
8. قد يحدث إلتهاب في جرح العملية أو مضاعفاته ومن ضمنه تسمم الدم وهو نادر.
9. قد يحدث ندبة مكان الجرح.
10. قد يحدث خدران وتنميل مكان الجرح.
11. قد يحدث التهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض.
12. قد تحدث جروح في منطقة العجان (شائع جداً).
13. قد يحدث تجمع دموي في منطقة العجان وسيتم معالجته بالطرق الطبية المناسبة.
14. قد يحدث عدم القدرة على التحكم بالإخراج أو السلس البولي.



جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

15. قد يحدث وجود آثار الملقط على وجه الجنين وجروح سطحية في الوجه.
16. قد يحدث اعتلال في العصب السابع للوجه لدى الجنين في حال استخدام الملقط وفي معظم الأحيان يكون مؤقتاً (نادر الحدوث).
17. قد يحدث تجمع دم تحت جلد فروة الرأس لدى الجنين في حال استخدام الشفاط.
18. قد يحدث تجمع دموي تحت جلدة الرأس لدى الجنين في حال استخدام الشفاط.
19. قد يحدث جروح سطحية في رأس الجنين في حال استخدام الشفاط.
20. قد يحدث زيادة نسبة الصفار للجنين.
21. قد يحدث نزف على شبكية العين لدى الجنين.
22. قد يحدث نزيف دماغي لدى الجنين وهو نادر جداً وفي الحالات الصعبة.
23. قد نحتاج لنقل دم للأم أو مكونات دم ومضاعفاته.
24. قد نحتاج في حال حدوث جروح شديدة في منطقة العجان أو المهبل فيتم إصلاحها تحت التخدير وما ينتج عن ذلك من مضاعفات.
25. قد تحدث حساسية لبعض أنواع الأدوية.
26. قد يحدث ناسور بين المثانة والمهبل أو بين المهبل والمستقيم أو الشرج.
27. قد تحدث خثرات دموية داخل الجسم.
28. قد يحدث إرتخاء في جدار المهبل.
29. قد يكون هناك احتمالية لإعادة الإجراء الجراحي اللازم.
30. لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن الإجراء.
31. قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

نوع التخدير:

التخدير النصفي

التخدير الموضعي

اسم المريضة / ولي الأمر: التوقيع:

شاهد: التوقيع:

التاريخ:

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب: التوقيع: التاريخ: