

عملية: تحريض الولادة الطبيعية

اسم الإجراء: إجراء تحريض للولادة الطبيعية

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: تحفيز بدء عملية الولادة الطبيعية لدى السيدة الحامل لوجود سبب طبي لدى الأم أو الجنين يستدعي ذلك ولمحاولة تجنب إجراء عملية ولادة قيصرية.

- قد يتأخر التحفيز لعدم وجود أماكن في غرفة الولادة أو بسبب إغلاق الخداج وسنقوم بإخباركم بالتفاصيل في حينها حيث أن هذه الأمور لا نستطيع التحكم بها قبل وقت الولادة.
- سنقوم بإعطاء المسكنات اللازمة.
- قد يتم حسب طلب المريضة وضع تخدير موضعي من خلال الظهر وسيتم شرح ذلك من خلال طبيب التخدير.
- سيتواجد طبيب الأطفال مع فريق النسائية والتوليد وقد يتواجد طبيب التخدير أيضاً.
- قد نحتاج إلى وضع قسطرة بولية.
- قد نحتاج لإجراء شق العجان لتسهيل الولادة.

المضاعفات: إن أي إجراء قد يحمل خطورة معينة و مضاعفات أثناء وبعد الإجراء.

الطرق المتبعة لتحفيز الولادة:

- استخدام التحاميل أو الجل المهلي يتم إعطاؤها حسب البروتوكولات الطبية.
- إجراء فتح في الأغشية حول الجنين لإخراج السائل الأمنيوسي.
- استخدام دواء وريدي لتحفيز / زيادة الإنقباضات الرحمية.
- قد يتم استخدام طريقة واحدة أو أكثر حسب الوضع الصحي للسيدة الحامل.

مضاعفات أثناء التحفيز:

1. قد يحدث فشل عملية التحفيز والحاجة لتكرارها.
2. قد نحتاج إلى إجراء عملية قيصرية في حال فشل التحريض.
3. قد يحدث فرط استجابة الرحم مما يؤدي لانقباضات متكررة في الرحم الذي قد يؤثر على نبض الجنين وسيتم التعامل مع الموضوع حسب الإجراءات الطبية اللازمة.
4. قد يحدث نزف رحمي أثناء التحريض.
5. قد يحدث ارتفاع بسيط في درجة حرارة الأم.
6. قد يحدث تمزق في جدار الرحم أو في عنق الرحم وهو نادر الحدوث وفي حال حدوث ذلك فنحتاج إلى عملية فتح بطن وطلب المساعدة من فرق طبية أخرى.
7. قد نضطر لإجراء عملية ولادة قيصرية طارئة في حال وجود سبب طبي طارئ لدى الجنين يدعو لذلك.
8. قد نحتاج لنقل دم أو مكونات دم، وما يترتب على ذلك من مضاعفات طبية.
9. قد تحدث حساسية لبعض أنواع الأدوية.
10. قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد التحفيز:

1. قد يحدث نزف رحمي أثناء وبعد الولادة.
2. قد تحدث التهابات بطانة الرحم بعد الولادة.
3. قد نحتاج في حال حدوث جروح في منطقة العجان أو المهبل يتم إصلاحها.
4. قد يحدث التهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
5. قد يحدث التهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه (تسمم الدم) وهو نادر.
6. قد يحدث ندبة مكان الجرح.
7. قد يحدث خدران وتنميل مكان الجرح.
8. قد يحدث التهاب الحوض أو قد يحدث خراج في الحوض.
9. قد تحدث جروح في منطقة العجان (شائع جدا).
10. قد يحدث تجمع دموي في منطقة العجان وسيتم معالجته بالطرق الطبية المناسبة.
11. قد يحدث عدم القدرة على التحكم بالإخراج أو السلس البولي.
12. قد نحتاج لنقل دم أو مكونات دم.
13. قد تحدث حساسية لبعض أنواع الأدوية.
14. قد نحتاج في حال حدوث جروح شديدة في منطقة العجان أو المهبل فيتم إصلاحها تحت التخدير.
15. قد يحدث ناسور بين المثانة والمهبل أو بين المهبل والمستقيم أو الشرج.
16. قد تحدث جلطات دموية.
17. قد يحدث إرتخاء في جدار المهبل.
18. قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول وإجراء اللازم.
19. قد تحدث الوفاء وهي نادرة جداً.

إجراءات إضافية قد تجرى خلال التحفيز:

- إجراءات تتم لتسهيل الولادة في حال حدوث عسر في ولادة الكتف.
فشل اكتمال الولادة المهبلية وإجراء ولادة قيصرية طارئة.

نوع التخدير:

التخدير النصفي

التخدير الموضعي

اسم المريضة / ولي الأمر: التوقيع:

شاهد: التوقيع:

التاريخ: