

إستئصال المبيض أو المبيضين أو الأكياس على المبيضين عن طريق فتح البطن

الغرض/الفائدة: تضمن العملية إزالة كيس أو الأكياس لوقف آلام البطن و الأعراض المصاحبة للكيس أو لعلاج إنتواء المبيض أو لأسباب طبية أخرى.

- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وستقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يتم إستئصال أحد المبيضين أو الإثنين معاً أثناء العملية لاسباب مختلفة منها النزيف المبيضي أو وجود نسيج مبيضي غير طبيعي أو أسباب طبية طارئة اخرى.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

النتيجة: إستئصال كيس أو أكياس من احد المبيضين أو المبيضين معاً.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث جرح في المثانة أو الحالب أو ربطه.
- قد يحدث جرح في الأمعاء وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد نحتاج إلى إصلاح أعضاء داخلية في حال تضررها (المثانة، الحالب، الأمعاء).
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنئين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث كدمات حول الجرح.
- قد يحدث إلتهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
- قد يحدث خلل مزمن في وظيفة المثانة.
- قد يحدث إلتهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه إنتان (تسمم الدم).
- تأخر في إلتئام الجرح.
- قد يحدث ندبة مكان الجرح.
- قد يحدث خدران وتنميل مكان الجرح.
- إلتهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض.
- قد يحدث نزيف داخلي متأخر.



جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد نحتاج إلى نقل دم أو مكونات دم. قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد تحدث التصاقات داخل البطن والحوض الذي قد تسبب الأم المزمنة و / أو صعوبة بالحمل.
- قد يحدث انسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود التصاقات يتطلب اجراء عملية أخرى.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين.
- قد يحدث فتق مكان جرح العملية.
- قد تحدث أعراض سن اليأس (أعراض نقص الهرمونات) بوقت مبكر عند استئصال أحد المبيضين أو كلاهما.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد..... التوقيع..... التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ