

جمعية إختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

نموذج إقرار طبي عملية: اصلاح التهبيطة المهبلية الأمامية

اسم الإجراء: إجراء عملية اصلاح التهبيطة المهبلية الأمامية

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: تحسين أعراض التهبيطة المهبلية الأمامية وتضيق المهبل

- سنقوم بإعطاء المسكنات اللازمة.
- سيتواجد طبيب التخدير مع فريق نسائية والتوليد.
 - سنحتاج إلى وضع قسطرة بولية.
 - قد نحتاج إلى وضع شاش معقم داخل المهبل.
 - قد ينصح الأطباء بعدم الجماع لمدة ستة أسابيع.
- قد تحتاج السيدة إلى الجلوس بطريقة معينة لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.
 - ممنوع قيادة المركبات لمدة أسبوعين بعد العملية.
- قد تحتاج السيدة إلى عدم استعمال وضع السجود او القرفصاء لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.

المضاعفات: إن أي إجراء أو عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناءه وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث الآم في موضع العملية
- قد يحدث نزف مهبلي قد يستدعي نقل دم او مكونات دم و هو نادر جداً
- قد يحصل اختراق في جدار المثانة وقد نحتاج لرتق هذا الثقب وتختلف كل حالة عن حالة أخرى
 - قد تحدث التهابات المسالك البولية أو احتباس البول
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين قد تحتاج المريضة وقتها إلى الدخول إلى وحدة العناية المركزة
 - قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
 - قد تحدث الوفاة و هي نادر ة جداً

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث نزيف مهبلي قد يحتاج إلى دخول مستشفى أو مراقبة او تداخلات جراحية أخرى
- قد يحدث إرتخاء مكان العملية ويكون هناك ضرورة لإعادة إجراء هذه العملية في ظروف نادرة جداً
 - قد يحدث التهاب بالجرح ويحتاج إلى مضادات حيوية
- قد يحدث حدوث خلل وظيفي بالمثانة (مؤقت أو دائم) وهذا الخلل قد يكون بحاجة إلى تدخل طبي أو جراحي
 - قد يحدث تضيق زائد في المهبل مما يتطلب إجراء عملية أخرى لتخفيف هذا التضيق
 - قد يحدث ناصور ما بين المهبل والمثانة ويحتاج إلى تدخلات جراحية لاحقة وهو نادر جداً
- في بعض حالات المضاعفات قد يكون هناك حاجة لاستشارة تخصصات جراحية أخرى مثل جراحة المسالك البولية
 - قد يحدث التهاب في المجاري البولية وقت يحتاج إلى مضادات حيوية
 - قد يحدث ألم أو صعوبة أثناء الجماع والذي قد يحتاج إلى وقت حتى يتحسن
 - قد نحتاج إلى إجراء شق كبير بالعجان في حال كانت هناك و لادة مهبلية بعد العملية



جمعية إختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يكون هناك ضرورة بأن تكون الولادة القادمة قيصرية حتى لا تتهتك ندبة العملية مع الولادة
 - قد يكون هناك حاجة للدخول للمستشفى مرة أخرى لظروف نادرة جداً
 - قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
 - قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين
 - قد يكون هناك حاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
 - قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية
 - قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

التخدير الكامل		
التخدير النصفي		
التخدير الموضعي		
اسم المريضة / ولي الأمر:		التوقيع:
شاهد:		. التوقيع:
التاريخ:		
لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرة المريضة على فهم	بشرح كافة المعلوما المعلومات بشكل كامل.	ات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي
اسم الطيب / ــة	ائته قبع	التا، بخ