

نموذج إقرار طبي

عملية: اصلاح التهبيطة المهبلية الخلفية

اسم الإجراء: إجراء عملية اصلاح التهبيطة المهبلية الخلفية

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: تحسين أعراض التهبيطة المهبلية الخلفية وتضييق المهبل

- سنقوم بإعطاء المسكنات اللازمة.
- سيتواجد طبيب التخدير مع فريق نسائية والتوليد.
- قد نحتاج إلى وضع قسطرة بولية.
- قد نحتاج إلى وضع شاش معقم داخل المهبل.
- قد ينصح الأطباء بعدم الجماع لمدة ستة أسابيع.
- قد تحتاج السيدة إلى الجلوس بطريقة معينة لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.
- ممنوع قيادة المركبات لمدة أسبوعين بعد العملية.

المضاعفات: إن أي إجراء أو عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناءه وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث الأم في موضع العملية
- قد يحدث نزف مهبلية قد يستدعي نقل دم او مكونات دم وهو نادر جداً
- قد يحصل اختراق في جدار الشرج وقد نحتاج لتدخل جراحي وقتها لرتق هذا الثقب وتختلف كل حالة عن حالة أخرى، قد يكون هناك حاجة لتدخل تخصصات مثل الجراحة العامة وجراحة القولون وقتها
- قد تحدث التهابات المسالك البولية أو احتباس البول
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين قد تحتاج المريضة إلى الدخول إلى وحدة العناية المركزة
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث نزيف مهبلية قد يحتاج إلى دخول مستشفى أو المراقبة أو تداخلات جراحية أخرى
- قد يحدث إرتخاء مكان العملية ويكون هناك ضرورة لإعادة إجراء هذه العملية في ظروف نادرة جداً
- قد يحدث التهاب بالجرح ويحتاج إلى مضادات حيوية
- قد يحدث ألم أو صعوبة أثناء الجماع والذي قد يحتاج إلى وقت حتى يتحسن
- قد يحدث تضيق زائد في المهبل مما يتطلب إجراء عملية لتخفيف هذا التضيق
- قد يحدث ناسور ما بين المهبل والشرج ويحتاج إلى تدخلات جراحية لاحقة وهو نادر جداً
- قد نحتاج إلى إجراء شق كبير بالعجان في حال كانت هناك ولادة مهبلية بعد العملية
- قد يكون هناك ضرورة بأن تكون الولادة القادمة قيصرية حتى لا تنتهك ندبة العملية مع الولادة
- قد تحتاج السيدة إلى عدم استعمال وضع السجود او القرفصاء لمدة لا تقل عن ستة أسابيع
- قد يحدث خراج في الحوض يحتاج الى دخول أو مضادات حيوية أو إجراءات طبية معينة



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- قد يكون هناك حاجة للدخول للمستشفى مرة أخرى لظروف نادرة جداً
- قد يحدث امسك أو صعوبة في إخراج البراز في حالات نادرة ووقتها يكون هناك حاجة لتدخل طبي أو جراحي بالإضافة لاستشارة تخصصات أخرى مثل الجراحة العامة أو جراحة القولون لحل المشكل
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين
- قد يكون هناك حاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

نوع التخدير:

التخدير الكامل

التخدير النصفي

التخدير الموضعي

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع أسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني أستطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي

للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرة المريضة على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب /ة التوقيع التاريخ