

## عملية: تنظيف الرحم مع احتمال أخذ عينات من بطانة الرحم

اسم الإجراء: عملية تنظيف للرحم واحتمال اخذ عينات من بطانة الرحم.

**الغرض/الفائدة المرجو من العملية:** إجراء جراحي (قد يكون علاجي) باستخدام المنظار الرحمي (يتم فحص الرحم من الداخل للتأكد من حجمه وشكله وإذا كان هناك التصاقات او زوائد لحمية او ليفية).

- قد يكون هنالك الحاجة لإجراء توسيع لعنق الرحم سواء باستخدام الأدوات الطبية الموسعة أو من خلال تحاميل مهبلية طبية (أدوية) يتم استخدامها قبل العملية لتوسيع عنق الرحم.
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وسنقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يحدث نزف رحمي يستمر لأسبوعين على الأكثر مماثل لدورة شهرية.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

**المضاعفات:** أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

### مضاعفات أثناء العملية:

- قد لا نستطيع الدخول بجهاز المنظار للتجويف الرحمي وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة.
- قد تحدث زيادة في نسبة العقم وذلك نادر.
- قد يحدث نزف رحمي قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد يحصل اختراق في جدار الرحم وقد نحتاج لمراقبة هذا الثقب داخل المستشفى أو إجراء عملية جراحية (فتح بطن أو تنظيف بطني) لرتق هذا الثقب وتختلف كل حالة على الأخرى.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية لإصلاح الأعضاء المتضررة حال وجودها وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للامعاء خارج البطن وحسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث جرح في عنق الرحم وقد نحتاج إلى رتقه وهو نادر.
- قد يحدث تمزق في عنق الرحم أو الرحم مما يستدعي رتقه.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنينين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.



جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة  
النسائية والتوليد الأردنية

## جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

### مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث التهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه (تسمم الدم).
- قد يحدث نزف رحمي قد يحتاج إلى دخول مستشفى او مراقبة او تداخلات جراحية أخرى.
- قد يحدث الأم في البطن والكتفين.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية وان حصل قد يكون هناك حاجة باحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأعضاء خارج البطن، وحسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث التهاب بالحوض أو قد يحدث خراج بالحوض أو التصاقات قد يُسبب الآلام المُزمنة.
- قد تحدث التصاقات داخل الرحم قد تسبب عقم، اذا كانت المريضة في سن الإنجاب.
- قد يحدث إرتخاء في عنق الرحم في الأحمال اللاحقة الذي قد يسبب إجهاضات في بداية الثلث الثاني من الحمل أو ولادات مبكرة مما قد يستدعي وضع غرزة على عنق الرحم اذا كانت المريضة في سن الإنجاب.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

### نوع التخدير:

التخدير الكامل أو النصفى  
التخدير الموضعي  
التنويم الجزئي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة ..... بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب ..... التوقيع ..... التاريخ .....

اسم الشاهد ..... التوقيع ..... التاريخ .....

أنا المريضة ..... قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها،

اسم المريضة ..... التوقيع ..... التاريخ .....

اسم الشاهد ..... التوقيع ..... التاريخ .....