

عملية: تنظير للبطن والحوض لإستئصال أكياس على المبايض أو المبايض

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: عملية تنظير للبطن والحوض لإستئصال أحد المبايض أو المبايض معاً تضمن العملية معاً لوقف آلام البطن أو لعلاج إلتواء المبيض أو لوجود أكياس أو أورام لأسباب طبية أخرى.

- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وستقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- فشل الدخول بجهاز المنظار لتجويف البطن والحوض وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة.
- قد يحدث جرح في المثانة أو الأمعاء أو الأوعية الدموية وهو نادر أن يحدث.
- قد تحدث زيادة في نسبة العقم في حال كانت المريضة في عمر الإنجاب
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية لإصلاح الأعضاء المتضررة حال وجودها وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن وحسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث إلتهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه إنتان (تسمم الدم).
- كدمات حول الجرح.
- إلتهاب المسالك البولية أو تهيج المثانة.
- إلتهاب في جرح العملية ونادراً ما قد ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.
- تأخر في إلتئام الجرح.
- قد يحدث ندبة مكان الجرح.
- قد يحدث خدران وتنميل مكان الجرح.
- إلتهاب الحوض أو قد يحدث خراج بالحوض قد تسبب الام مزمنة.
- نزيف داخلي متأخر.



جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة
النسائية والتوليد الأردنية

جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية The Jordanian Society of Obstetricians and Gynecologists

- نقل دم أو مكونات دم. قد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد تحدث إلتصاقات داخل البطن والحوض الذي قد تسبب الأم المزمنة و / أو صعوبة بالحمل.
- قد يحدث انسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود إلتصاقات يتطلب اجراء عملية أخرى.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين.
- قد يحدث فتق مكان جرح العملية.
- قد يحدث هبوط في عمل المبيض جزئي أو كلي بعد التداخل الجراحي.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

نوع التخدير:

التخدير الكامل أو النصفى
التخدير الموضعي
التنويم الجزئي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد..... التوقيع..... التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة..... التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ